

Bécasseau	tête	pattes	ailes	corps	Cri en vol	Comportement et habitat
minuscule L=11-12 cm W= 9-27 g	Petite tête ronde, œil saillant. Bec mince, légèrement recourbé. Tache brune sur la joue. Peu de blanc sur la figure .	Patte jaunes-verdâtres, parfois sales, mais pas noires. Mince ossature. Genou très courbé. Orteils non palmés. Pli beaucoup les pattes vers l'avant en se nourrissant.	Les primaires dépassent à peine les tertiaires et ne dépassent pas la queue. En vol, bout arrondi. En automne, manque souvent des plumes (mue).	Taille d'un moineau. Plus brun que le semipalmé. Peu de blanc sur la poitrine.	Cri plus aigu que le B. de Baird. Un <i>kruiii</i> aigu ou un <i>prrrit</i> répété.	Semble accroupi quand il mange. Marche doucement en balayant la tête d'un côté et de l'autre. Se tient à l'écart dans un groupe multispécifique. Forme rarement de grands groupes. Nerveux, arrête pour regarder g/d et fige quand il y a un bruit. Vole comme une chauve-souris. Fréquente les zones vaseuses près des herbes où il peut facilement se dissimuler.
semipalmé L=14-17 cm W= 14-41 moy 28 g Le plus commun	Sembl trop petite pour le corps. Bec généralement court et droit, mais la longueur peut varier beaucoup, les plus longs becs semblent tombants.Cou large. Plus de blanc dans la figure avec lore et béret foncé.	Patte noires. Ossatures plus épaisse que le B. minuscule. Orteil central et extérieure semipalmé. Les pattes semblent plus centrées que le B. d'Alaska.	Subtile projection des primaires au-delà de la queue. Les primaires dépassent les tertiaires de la longueur d'un lore environ.	Plus gris-brun ou gris et plus pâle que le B. minuscule. Plus rond et compact qu'élancé (B. d'Alaska). Paraît dans l'ensemble bien balancé.	Un <i>chiip</i> ou <i>chrrk</i> généralement plus grave que le B. d'Alaska. Parfois répété en un trille rapide.	Marche rapidement. Pique nerveusement à la surface. Bascule le cou pour manger tout en gardant le corps droit. Souvent en grand groupe. Vigilant, il regarde nerveusement gauche/droite. Nombreuses interactions entre les individus. Plus agressif que le B. d'Alaska. Rivage boueux.
d'Alaska L= 14-17 cm W= 22-35 g	Bec plus long, épais et plus tombant que le B. semipalmé. Tête plus grosse avec l'œil décentré vers l'avant. Semble trop grosse pour le corps. Cou plus large.	Patte noires aux orteils semipalmés. Paraissent longues en comparaison du B. semipalmé.	Subtile projection au-delà de la queue. Manque des plumes de vol (rarement le cas du B. semipalmé). Primaires dépassent les tertiaires d'un lore approx.	Partie antérieure du corps semble plus grosse que la postérieure. Dessus gris pâle. Plus élancé que compact. La mue débutée permet de le distinguer du semipalmé: peu manquer des plumes en vol.	Un <i>chiip</i> , <i>shit</i> ou <i>shik</i> tenu, plus aigu que le B. semipalmé mais moins que le B. à croupion blanc. Accompagné souvent de <i>chevit</i> , <i>chevivit</i> .	Se nourrit en prélevement à la surface ou en pénétrant légèrement la boue. Préfère les plages plus sableuses que le B. semipalmé. Démarche plus lente et hésitante que le B. semipalmé.
de Baird L= 14-18 cm W= 28-58 g	Bec fin sur toute sa longueur, un peu plus court, droit et pointu que le B. à croupion blanc. Face unie au lore foncé. Œil proéminent qui le fait paraître effrayé. Secoue la tête à chaque pas.	Patte noires et courtes.	Ailes qui se croisent, dépassent les tertiaires et se projettent bien au-delà de la queue.	Beige. Bandes de la poitrine pâles mais complètes. Flancs blancs propres. Frome aplatie qui donne une allure ovoïde en vue de face.	<i>Crîp</i> ou <i>cripit</i> roulé, plus grave et monotone que le B. minuscule. Moins vocal que le B. à croupion blanc.	Marche en petits pas réguliers qui lui donne l'air d'être lent, de traîner les pieds (distinctif). S'alimente dans les zones plus sèches des rivages. Prélève à la surface de l'eau. Souvent associé aux B. minuscules. Pattes courtes et forme aplatie en vue de face sont distinctifs.
à croupion blanc L=15-17 cm W=25-51 g	Bec de longueur moyenne et épais au bout retombant. Tête plus large que le B. de Baird.	Noires et courtes qui donnent à l'oiseau l'apparence d'être aplati ou d'embrasser le sol.	Ailes qui se croisent, dépassent les tertiaires et se projettent bien au-delà de la queue.	Dos et ailes grisâtres. Corps élancé . Poitrine forte aux finement striés. Croupion blanc visible en vol.	<i>Sît</i> , <i>jiit</i> ou <i>chiip</i> répété généralement plus aigu que les autres bécasseaux. <i>Tsiik</i> comme un insecte.	Stature droite. Marche régulière. Se nourrit vite et agressivement. Fait parfois la scie sauteuse. Projette vers l'avant son bec pour manger. En se penchant, sa queue monte et descend. Plages herbeuses avec les autres bécasseaux. Associé à un groupe de B. semipalmés, se tient généralement en marge dans les aires plus herbeuses.